

## Dé el siguiente paso

**ED  
CURE**

### Visite [EDCure.org](http://EDCure.org)\* para:

- Hacer el cuestionario en línea sobre disfunción eréctil y obtener resultados de tratamiento personalizados
- Buscar un especialista en disfunción eréctil en su zona
- Registrarse en seminarios educativos gratuitos para informarse más acerca de las opciones de tratamiento
- Escuchar cómo otras personas reales como usted han encontrado la solución para su disfunción eréctil
- Obtener respuestas comunes a preguntas comunes acerca de la disfunción eréctil, los implantes penianos y la cobertura del seguro

**dLife**  
IT'S YOUR DIABETES LIFE!

### Visite [www.dLife.com](http://www.dLife.com) para:

- Conectarse con millones de pacientes con diabetes y cuidadores de pacientes diabéticos
- Obtener herramientas y recursos gratuitos que lo ayudarán a autogestionar mejor su diabetes
- Descubrir seminarios web gratuitos sobre diferentes temas relacionados con la diabetes

### Hable con alguien que lo haya vivido.

Envíenos un correo electrónico a [MHPatientEducation@bsci.com](mailto:MHPatientEducation@bsci.com) o llámenos al **1-844-4ED-CURE** y lo pondremos en contacto con un paciente que encontró un tratamiento exitoso para su disfunción eréctil.

## Referencias

1. Phé V, Rouprêt M. Erectile dysfunction and diabetes: A review of the current evidence-based medicine and a synthesis of the main available therapies. *Diabetes Metab.* 2012 Feb;38(1):1-13. 2. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009 May;6(5):1232-47. 3. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. WebMD Website: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Accessed December 3, 2014. 4. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2014 May-Jun;26(3):112-5. 5. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2. 6. Data on file with Boston Scientific. 7. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5. 8. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accessed December 3, 2014. 9. FDA Approval Letter, N970012-S065.

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.  
©2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
MH-550101-AA JUN 2018

\* EDCure.org es un sitio web patrocinado por Boston Scientific.



## Disfunción eréctil y diabetes

# Encuentre la cura para su disfunción eréctil

Póngale fin a su frustración. Renueve su confianza. Siéntase completo.




“Tenía 32 años cuando los médicos me dijeron todas las cosas que podía esperar... problemas con los ojos, el corazón, los riñones, el hígado, la circulación y finalmente la disfunción eréctil. Durante el primer año empecé a tener problemas de disfunción eréctil.”

- Tom

# Bienvenido

La disfunción eréctil afecta a **1 de cada 2 hombres** con diabetes.<sup>1</sup>



Este folleto está diseñado para ayudarlo a entender mejor la conexión que existe entre la disfunción eréctil (DE) y la diabetes y qué pasos puede seguir para encontrar una solución para recuperar la confianza, el control y la plenitud que busca con una vida sexual activa y satisfactoria.

“Literalmente viví eso, con poco más de 40 años, pensaba que nunca volvería a tener una vida sexual normal”.

- Benno

*Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales con diabetes que han intentado otras opciones de tratamiento para su disfunción eréctil y que finalmente han recibido un implante peniano. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.*

## Disfunción eréctil y diabetes

Con el tiempo, es muy común que las personas con diabetes sufran daños nerviosos debido a los altos niveles de azúcar en la sangre. El daño nervioso causado por la diabetes puede llevar a la pérdida de sensación o de sensibilidad en los pies o las manos. También puede causar problemas en la digestión, para ir al baño o al tener relaciones sexuales.<sup>2,3</sup>

Si usted es un hombre con diabetes que sufre disfunción eréctil, es decir, la incapacidad de conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme o que dure el tiempo suficiente como para tener relaciones sexuales satisfactorias, sepa que no está solo.

**Los hombres con diabetes tienen 3 veces más probabilidades de padecer disfunción eréctil y esta aparece unos 10 a 15 años antes que en los hombres sin diabetes.<sup>2</sup>**

“Me gustaría que mis médicos hubieran sido más directos al preguntar sobre esta complicación particular de la diabetes. No habría esperado tanto tiempo para hacer algo al respecto”.

- Kerry

Es dos veces más probable que los hombres con diabetes elijan un implante peniano para tratar su disfunción eréctil en comparación con los que no tienen diabetes.<sup>4</sup>

### Dé el siguiente paso

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción eréctil puede ser un acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres y sus parejas, los cuales pueden haber luchado durante años contra una afección que puede tener impacto en la autoestima y afectar sus relaciones más íntimas.



“Lidiar con la disfunción eréctil realmente supone una enorme carga emocional”.

- Tom

### Encuentre la cura para su disfunción eréctil

Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la disfunción eréctil en la actualidad. Los medicamentos por vía oral son un primer paso común, pero no funcionan para todo el mundo, especialmente en las personas con diabetes: los inhibidores de la PDE5 (el tipo de medicamentos al que pertenecen Viagra™, Cialis™ y Levitra™) han demostrado ser menos eficaces en hombres con diabetes.<sup>2</sup> Los hombres con diabetes y disfunción eréctil tienen más probabilidades de que se les prescriba un tratamiento que vaya más allá de los medicamentos.<sup>4</sup>

“Con la disfunción eréctil, es como si no dieras la talla como hombre, actúa sobre ti de formas muy sutiles”.


- Dave

## Conozca todas sus opciones

Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que sufren de disfunción eréctil. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos por vía oral, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes penianos. Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

El implante peniano es una solución única porque permite tener intimidad donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni sus costos constantes.

Los implantes penianos se usan clínicamente desde hace más de 40 años<sup>5</sup> y cerca de **500,000 pacientes** han sido tratados con un implante peniano.<sup>6</sup>



“Lo que el implante peniano hace por un hombre es cambiarle la vida absolutamente. Ha sido una experiencia maravillosa para los dos. Llevamos 40 años de matrimonio y estamos teniendo los mejores encuentros sexuales de nuestras vidas”.

- Dave



“Los implantes son una esperanza para millones de hombres como yo. La mayoría de la gente con disfunción eréctil puede recibir ayuda hoy en día”.

- Benno

## ¿Un implante peniano podría ser la solución para usted?

El implante peniano queda totalmente contenido dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil de manejar. Permite tener una erección en el momento que elija, y una vez activado, puede mantener la erección el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la eyaculación ni el orgasmo.<sup>7,8</sup>

Algunos implantes penianos vienen impregnados previamente con antibióticos y se ha demostrado clínicamente que reducen el riesgo de cirugía de revisión debido a infecciones.<sup>9</sup>