



Encuentre la cura para su ED

Póngale fin a su frustración.

Renueve su confianza.

Siéntase completo.



86-90%

de los pacientes con disfunción eréctil y enfermedad de La Peyronie informan que están satisfechos con una prótesis de pene inflable.¹

Le damos la bienvenida

Este folleto está diseñado para ayudarlo entender mejor la conexión entre la disfunción eréctil y la enfermedad de La Peyronie (EP), y cómo puede encontrar una solución y recuperar la confianza, la espontaneidad y la intimidad que forman parte de una vida sexual activa y satisfactoria.

La disfunción eréctil es la incapacidad de alcanzar o mantener una erección suficiente para el acto sexual o coito. A veces los hombres que tienen disfunción eréctil también tienen enfermedad de La Peyronie. Afortunadamente, los urólogos que se especializan en salud sexual están capacitados para tratar tanto la disfunción eréctil como la enfermedad de La Peyronie.

Enfermedad de La Peyronie

La enfermedad de La Peyronie se caracteriza por dolor en el pene y curvatura o deformidad peniana. Las causas de la EP no se conocen bien, pero la enfermedad podría ser el resultado de lesiones repetidas en el pene, predisposición genética y trastornos del tejido conectivo, la edad u otras patologías médicas.²

El tamaño y la forma del pene varía, por lo que un pene curvo no debería ser motivo de preocupación. Pero si la curvatura peniana le impide tener relaciones sexuales o le provoca dolor, debe consultar a su médico. Aproximadamente un tercio de los hombres con enfermedad de La Peyronie presentan dolor y una curvatura anormal en el pene.³

Disfunción eréctil y enfermedad de La Peyronie

La disfunción eréctil es común en hombres con la enfermedad de La Peyronie. La enfermedad de La Peyronie se presenta en aproximadamente un 9% de los hombres adultos, pero aproximadamente un 75% de los hombres con esta enfermedad también sufren disfunción eréctil.⁴

Los estudios han mostrado que el 22 al 54% de los hombres que padecen EP a menudo tienen dificultades para tener erecciones lo suficientemente firmes como para tener relaciones sexuales.⁵

Los efectos de la EP y la disfunción eréctil pueden ser duraderos si no se tratan. Estas afecciones a menudo provocan un aumento del riesgo de sufrir depresión, baja autoestima y dificultades con las relaciones. Estos problemas pueden afectar la calidad de vida del hombre y también de su pareja.⁶



Los hombres con disfunción eréctil pueden ser tratados eficazmente con un implante de pene de Boston Scientific, tengan o no enfermedad de La Peyronie.



Después de la cirugía de implante, **más de dos tercios** de los pacientes con EP y disfunción eréctil informaron una mayor confianza en sí mismos.⁷

Dar el siguiente paso

Una vez que ha hablado con su médico acerca de la enfermedad de La Peyronie y la disfunción eréctil, existen varias opciones de tratamiento que puede investigar. Encontrar un tratamiento satisfactorio para la EP puede ser un acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres (y de sus parejas), quienes posiblemente hayan luchado durante años contra una afección que puede afectar a la autoestima y a sus relaciones íntimas.

Encuentre la cura para su disfunción eréctil

Durante los procedimientos para tratar la enfermedad de La Peyronie, se le puede implantar una prótesis de pene inflable para tratar la disfunción eréctil. En un estudio de hombres con disfunción eréctil y EP, 98% consiguieron la resolución completa de la curvatura peniana con un implante y modelado de pene de Boston Scientific.⁷


Conozca todas sus opciones

Es importante que comprenda que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que sufren de disfunción eréctil y enfermedad de La Peyronie. Las opciones de tratamiento para la disfunción eréctil incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes de pene. Las opciones de tratamiento para la EP incluyen medicación (XIAFLEX®) o procedimientos de plicatura, incisión o escisión e injerto. Si un hombre tiene disfunción eréctil, otra opción es un procedimiento de implante de pene con o sin material de injerto.²

Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros.

Los implantes de pene se usan clínicamente desde hace 40 años⁸ y cerca de 500,000 han sido tratados con a Boston Scientific implant.⁹ El uso de un implante de pene da como resultado una erección rígida y les brinda espontaneidad a los hombres. Es fiable, sin los efectos secundarios ni los costes continuos de los medicamentos.

Implante de pene AMS 700



¿Un implante de pene AMS 700™ podría ser adecuado para usted?

El implante peniano queda totalmente contenido dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple de manejar. Permite tener una erección en el momento que elija, y una vez activado, puede mantener la erección el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la eyaculación ni el orgasmo.¹⁰

El implante AMS 700 es el único implante que viene preimpregnado con el antibiótico InhibiZone™ y ha demostrado reducir el riesgo de cirugía de revisión debido a infecciones.

El 92% de los pacientes y el 96% de sus parejas califican su actividad sexual con el implante como excelente o satisfactoria.¹⁰

Precaución: las leyes federales de EE. UU. sólo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad.

La prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™ está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). El implante de una prótesis de pene daña o destruye toda capacidad remanente de tener una erección natural, además de imposibilitar otras opciones de tratamiento.

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden tener un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o cicatrices en el pene. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). Es posible que este dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que son alérgicos a los antibióticos que contiene (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina) o sufren de lupus sistémico.

Entre los riesgos se pueden mencionar: falla o mal funcionamiento del dispositivo que hace necesaria otra cirugía, migración del dispositivo que podría ocasionar la exposición a través del tejido, desgaste o pérdida de tejido (dispositivo/erosión del tejido), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor o molestias.

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific.

Dé el siguiente paso

ED
CURE

Visite EDCure.org/es para:

- Hacer el cuestionario en línea de disfunción eréctil y obtener resultados personalizados de tratamiento
- Buscar un especialista en disfunción eréctil en su zona
- Registrarse en seminarios educativos gratuitos para informarse más acerca de las opciones de tratamiento
- Escuchar cómo otras personas reales han encontrado la solución para su disfunción eréctil
- Obtener respuestas comunes a preguntas comunes acerca de la disfunción eréctil, los implantes de pene y la cobertura del seguro

Hable con alguien que lo haya vivido.

Envíenos un correo electrónico a MHPatientEducation@bsci.com o llame al **1-844-4ED-CURE** y lo pondremos en contacto con un paciente.

Referencias bibliográficas

1. Yafi FA, Sangkum P, McCaslin IR, et al. Strategies for penile prosthesis placement in Peyronie's disease and corporal fibrosis. *Curr Urol Rep.* 2015 Apr;16(4):21.
2. Peyronie's disease. Mayo Clinic. www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peyronies-disease/symptoms-causes/syc-20353468. Accessed January 9, 2016.
3. Sullivan J, Moskovic D, Nelson C, et al. Peyronie's disease: urologist's knowledge base and practice patterns. *Andrology.* 2015 Mar;3(2):260-4.
4. Kirby EW, Verges D, Matthews J, et al. Low testosterone has a similar prevalence among men with sexual dysfunction due to either Peyronie's disease or erectile dysfunction and does not correlate with Peyronie's disease severity. *J Sex Med.* 2015 Mar;12(3):690-6.
5. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters: www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7. Accessed December 3, 2014.
6. Chung E. Diagnosis and management of Peyronie's disease: an evidence-based review. *Trends in Urology & Men's Health.* 2015 Jan/Feb;18-22.
7. Chung E, Solomon M, DeYoung L, et al. Comparison between AMS 700™ CX and Coloplast™ Titan inflatable penile prosthesis for Peyronie's disease treatment and remodeling: clinical outcomes and patient satisfaction. *J Sex Med.* 2013 Nov;10(11):2855-60.
8. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
9. Data on file with Boston Scientific.
10. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way,
Marlborough, MA 01752-1234
www.bostonscientific.com

© 2018 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

MH-494103S-AA FEB 2018

CONTENIDO PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS A TRAVÉS DE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES EN TODO EL MUNDO.