



NO ESTÁ SOLO

*Disfunción eréctil
y diabetes*

La DE afecta a entre
un 35 % y un 90 %
de hombres con
diabetes.¹


Le damos la bienvenida

Este folleto está diseñado para ayudarle a entender mejor la conexión entre la disfunción eréctil (DE) y la diabetes, y cómo puede encontrar una solución para recuperar la **confianza**, el **control** y la **plenitud** que busca con una **vida sexual activa y satisfactoria**.

“Estaba allí, con poco más de 40 años, pensando que nunca volvería a tener una vida sexual normal de nuevo”.

– Benno Schmidt

Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales con diabetes que han intentado otras opciones de tratamiento para su DE y que finalmente han recibido un implante peneano. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.



DE y diabetes

Con el tiempo, es muy común que las personas con diabetes sufran daños nerviosos debido a los altos niveles de azúcar en la sangre. El daño diabético de los nervios puede llevar a la pérdida de sensaciones o sensibilidad en los pies o las manos. También puede causar problemas en la digestión, para ir al baño o al tener relaciones sexuales.^{1,2}

Si usted es un hombre con diabetes que sufre DE — incapacidad de conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme o que dure el tiempo suficiente como para tener relaciones sexuales satisfactorias— sepa que no está solo. Los hombres con diabetes tienen 3 veces más probabilidades de sufrir DE y esta aparece unos 10-15 años antes que en los hombres sin diabetes.¹

“Tenía 32 años y los médicos me dijeron todas las cosas que podía esperar... problemas con los ojos, el corazón, los riñones, el hígado, la circulación y, finalmente, la DE. Durante el primer año empecé a tener problemas de DE”.

— Tom Waters



“Me gustaría que mis médicos hubieran sido más directos al preguntar sobre esta complicación particular de la diabetes. No habría esperado tanto tiempo para hacer algo al respecto”.

– Kerry Marino

La conexión emocional

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la DE puede ser un acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres y sus parejas, los cuales pueden haber luchado durante años contra una afección que puede tener impacto sobre la autoestima y afectar a sus relaciones más íntimas.

“Tratar con la DE realmente supone una enorme carga emocional”.

– Tom Waters

“Con DE, no solo mides las cosas desde un punto de vista masculino. Actúa sobre ti de formas muy sutiles”.

– Dave Edson



Los hombres con diabetes tienen de 1,5 a 2 veces más probabilidades de pasar a **tratamientos más avanzados para la DE** que aquellos sin diabetes.³

Descubra la esperanza

Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la DE en la actualidad. Los medicamentos orales son un primer paso común, pero no funcionan para todo el mundo, especialmente en las personas con diabetes: los inhibidores PDE5 (el tipo de medicamentos al que pertenecen Viagra^{TM†}, Cialis^{TM†} y Levitra^{TM†}) han demostrado ser menos eficaces en hombres con diabetes.¹ Los hombres con diabetes y DE tienen más probabilidades de que se les prescriba un tratamiento que vaya más allá de los medicamentos.³

El 92 % de los pacientes y el 96 % de sus parejas califican su actividad sexual con el implante como **excelente** o **satisfactoria**⁴

Conozca todas sus opciones

Lo importante es saber que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que sufren DE. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes peneanos. Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

Un implante peneano es una solución única porque permite tener intimidad donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni sus costes continuos.

Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos con el implante peneano. Los implantes peneanos se usan clínicamente desde hace más de 40 años⁵ y más de 400.000 pacientes han sido tratados con un implante peneano de AMS.⁶

“Los implantes son la esperanza de millones de personas como yo. La mayoría de la gente con DE pueden recibir ayuda hoy”.



¿Podría ser un implante peneano la respuesta a su caso?

Un implante peneano queda totalmente contenido dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil de manejar. Proporciona la capacidad de tener una erección en el momento que elija, y una vez activado, puede mantener la erección el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la eyaculación ni el orgasmo.^{4,7}

“Lo que el implante peneano hace por un hombre es cambiarle la vida absolutamente. Ha sido una experiencia maravillosa para los dos. 40 años de matrimonio y estamos teniendo los mejores encuentros sexuales de nuestras vidas”.

– Dave Edson

Los implantes peneanos han ayudado a cientos de miles de hombres a regresar a una vida sexual activa y satisfactoria.⁸

Dé el próximo paso

• Sepa más acerca de la DE

y su impacto en hombres con diabetes
en www.edcure.org

• Hable con un urólogo especializado en DE

que le ofrezca la gama completa de opciones de tratamiento, incluidos los implantes. ¿Necesita ayuda para encontrar un médico experimentado cerca de usted? Visite nuestro apartado “Buscar un médico” en www.edcure.org o póngase en contacto con el coordinador de educación de pacientes en PatientEducation@ammd.com o 1-844-4ED-CURE.

• Hable con alguien que lo haya vivido.

Envíenos un correo electrónico a PatientEducation@ammd.com o llame al 1-844-4ED-CURE y entre en contacto con un paciente que encontró un tratamiento adecuado para su DE.

• **dLife es la primera plataforma** para informar, inspirar y conectar con millones de pacientes y cuidadores de diabetes. Para obtener herramientas y recursos gratuitos que le ayudarán a autogestionar mejor su diabetes, vaya a www.dlife.com



1. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009;6(5): 1232-47.
2. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. WebMD Website: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Accessed December 3, 2014.
3. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, Saigal C, Wessells H. Men with diabetes may require more aggressive treatment for ED. *Int J of Impotence Research* 2013; 26:112-115.
4. Montorsi R, Rigatti P, Carmignani G, et al. AS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000; (37):50-55.
5. Scott F, Brantly W, Timm G. Management of erectile impotence. *Urol* 1973; (2):80-82.
6. Data on file at AMS.
7. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accessed December 3, 2014.
8. Penile prosthesis. <http://www.essm.org/society/esh/malesd/ortaltreatments/penileprosthesis.html>. European Society for Sexual Medicine (ESSM) Web site. Downloaded January 1, 2013.

^{TM†} Las marcas indicadas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Solamente Rx

TM Las marcas indicadas son marcas comerciales o marcas registradas de American Medical Systems, Inc. © 2014 American Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Minnetonka, MN 55343
AMCUS/ED-01368(1)a/Diciembre de 2014
www.AmericanMedicalSystems.com
1-800-328-3881
Uso en EE. UU. e internacional