

¿Qué es la HBP?

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es el agrandamiento de la próstata, que afecta a un 50% de los hombres para los 60 años y hasta un 90% de los hombres para los 85 años.¹ Este agrandamiento puede comprimir la uretra, lo que reduce el flujo de orina de la vejiga y, a veces, lo bloquea por completo.

Entre los síntomas de HBP se incluyen los siguientes:

- Frecuencia urinaria
- Flujo irregular
- Urgencia urinaria
- Chorro débil
- Esfuerzo
- Levantarse de noche para orinar

Tratamiento de la HBP

¿No está listo para una cirugía, pero no desea tomar medicamentos? El tratamiento con vapor de agua Rezūm™ es una opción diseñada para reducir los síntomas de HBP en los hombres que tienen próstatas agrandadas, sin los efectos secundarios de los medicamentos para la HBP.

Hable con su médico para ver si el tratamiento con vapor de agua Rezūm™ es adecuado para usted u obtenga más información en www.TreatMyBPH.com

Todos los tratamientos suponen riesgos inherentes y asociados. El sistema Rezūm™ está previsto para aliviar síntomas y obstrucciones, y reducir el tejido de la próstata asociado con la HBP. Está indicado para hombres ≥50 años con un volumen de próstata de 30 cm³ ≤80 cm³. El sistema Rezūm también está indicado para el tratamiento de próstata con hiperplasia en la zona central o en un lóbulo medio. Los posibles riesgos incluyen, entre otros, dolor al orinar (disuria), sangre en la orina (hematuria), sangre en el semen (hematospermia), disminución del volumen eyaculatorio, sospecha de infección de las vías urinarias (IVU), y frecuencia de micción, retención o urgencia urinaria. Debe hablar con su médico acerca de los beneficios y los riesgos antes de decidir cualquier opción de tratamiento.

*Depende de la situación clínica individual y la respuesta de curación.

1. Barry M, Roehrborn C. Management of benign prostatic hyperplasia. *Ann Rev Med.* 1997 Feb;48:177-189.
2. McVary KT, Gange SN, Gittelman MC, et al. Minimally invasive prostate convective water vapor energy (WAVE) ablation: A multicenter, randomized, controlled study for treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol.* 2016 May;195(5):1529-38.

Precaución: Las leyes federales de los EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

La información que se incluye en este folleto se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico ni debe usarse para obtener diagnósticos médicos. Boston Scientific le recomienda enfáticamente que consulte a su médico sobre todas las cuestiones relacionadas con su salud o para que responda las preguntas clínicas/médicas que tenga.

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

©2019 Boston Scientific Corporation
o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

URO-562805S-AA APR 2019

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

EL CONTENIDO ES PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES DE TODO EL MUNDO.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

**Tratamiento
mínimamente
invasivo para la HBP**

Tratamiento con vapor de agua **Rezūm™**

La HBP afecta al
50%
de los hombres
para los 60 años

y hasta el
90%
de los hombres
para los 85 años¹




Vea la diferencia

El tratamiento con vapor de agua Rezūm™ utiliza la energía natural contenida en el vapor de agua. Los estudios clínicos muestran un perfil de seguridad positivo con la capacidad de aliviar los síntomas asociados con la HBP.²

Durante cada tratamiento de 9 segundos, se libera vapor de agua estéril a lo largo de todo el tejido prostático objetivo. Cuando el vapor se vuelve a convertir en agua, se libera toda la energía almacenada, lo que hace que mueran las células.

Con el tiempo, la respuesta de curación natural del cuerpo elimina las células muertas y achica la próstata. Con la eliminación del tejido adicional, la uretra se abre, lo que reduce los síntomas de HBP.

La mayoría de los pacientes comienzan a sentir un alivio de los síntomas tan solo dos semanas después del tratamiento, y el beneficio máximo puede presentarse en un plazo de tres meses. Las respuestas pueden y suelen variar de un paciente a otro.



La cantidad de tratamientos con vapor de agua que deba hacerse varía según el tamaño de la próstata. El procedimiento se realiza durante una cita. Con las imágenes que se muestran más arriba se pretende mostrar cómo funciona el procedimiento, no proporcionar una representación exacta de los resultados de los pacientes.

Pregúntele a su médico si el tratamiento con vapor de agua Rezūm™ es adecuado para usted.

3 pasos simples

Lo que sigue pretende ser una descripción general; usted puede tener una experiencia diferente. Hable con su médico acerca de las preguntas que tenga con respecto al procedimiento.

1. Antes del procedimiento

- El médico podría interrumpir la administración de anticoagulantes (diluyentes de la sangre) entre unos días y una semana antes del procedimiento.
- Le podría recetar antibióticos.
- El médico hablará con usted sobre los analgésicos que se usarán.

2. Día del procedimiento

- El procedimiento en sí solo tarda unos minutos; sin embargo, prepárese para que toda la cita dure, aproximadamente, dos horas.
- Recibirá los analgésicos que recete su médico para el procedimiento.
- Organícese para que alguien lo lleve a la cita, salvo que el médico le diga que puede conducir solo a casa.



3. Regreso a sus actividades cotidianas

- Después del procedimiento, siga tomando los antibióticos por vía oral según la indicación de su médico.
- Su médico podría recomendar la colocación de una sonda por algunos días, para facilitar la micción durante el proceso de curación.
- Evite las actividades que podrían irritarle la próstata. Consulte a su médico para obtener recomendaciones específicas.
- Si tiene molestias:
 - Tome un analgésico leve, según le recomiende su médico.
 - Pruebe con un baño de agua tibia o sentarse sobre una bolsa de agua caliente.
 - Considere eliminar temporalmente de su dieta el consumo de cafeína, chocolate y alcohol.

En unos pocos días, lo más probable es que pueda retomar sus actividades normales*, y la mayoría de los pacientes notan una marcada mejora de los síntomas tan solo dos semanas después del tratamiento.²