

# Siéntase lleno más rápido para ayudar a mantener su pérdida de peso

Una pequeña ayuda es muy útil. La gastroplastia endoscópica en manga (Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG) reduce el tamaño del estómago mediante suturas que se colocan a través de la boca durante un procedimiento ambulatorio, lo que ayuda a los pacientes a comer menos, sentirse llenos más rápido y lograr una pérdida de peso significativa y duradera cuando se combina con modificaciones del estilo de vida.

## **Sin incisiones. Sin cicatrices. Recuperación rápida.**

La gastroplastia endoscópica en manga (ESG) puede ser una opción eficaz para adultos con un IMC de entre 30 y 50 que desean una solución para perder peso de forma duradera y mínimamente invasiva.



**En un estudio clínico aleatorizado,<sup>1</sup> los pacientes con ESG:**

Bajaron un promedio de  
**13,6%**  
**de peso corporal total**  
en el primer año.



El 68% mantuvo un  
**25%**  
**de pérdida de peso corporal excesivo o más, 24 meses**  
después de la intervención.

La ESG se realiza utilizando el sistema de sutura endoscópica OverStitch™ y el sistema OverStitch NXT™.

Todas las intervenciones médicas conllevan riesgos. Hable con su médico acerca de los riesgos y beneficios asociados con la intervención ESG. Si tiene preguntas sobre estos dispositivos, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de EE. UU. de Boston Scientific al teléfono +1-888-272-1001 o visite Endura.com.

## **Sistema de sutura endoscópica y Sistema de sutura endoscópica OverStitch NXT ("OverStitch") para cirugía bariátrica:**

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

Hable con su médico para comprender completamente todos los riesgos y beneficios asociados al uso de este dispositivo. Pregunte a su médico si este dispositivo es adecuado para usted.

#### **INDICACIONES DE USO:**

OverStitch está destinado a pacientes adultos con obesidad con un IMC de entre 30 y 50 kg/m<sup>2</sup>. OverStitch puede reducir el tamaño del estómago al coser el interior. También puede reparar la salida del estómago de una cirugía de derivación gástrica previa.

Cuando se utiliza OverStitch para ayudar con la pérdida de peso, el paciente debe seguir una dieta saludable y un programa de ejercicios. No puede perder peso si no adopta hábitos saludables.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

Su médico le preguntará acerca de su historia clínica y le realizará un examen físico para decidir si OverStitch es adecuado para usted. En el momento de la intervención, es posible que el médico detecte problemas internos que le impidan recibir OverStitch. Por ejemplo, las úlceras o inflamación estomacales pueden afectar la colocación del dispositivo.

No debe recibir OverStitch si: tiene una hernia de hiato grande; tiene antecedentes de sangrado en el estómago o en el esófago; tiene antecedentes de trastornos alimenticios; está embarazada; presenta trastornos hemorrágicos o si está tomando anticoagulantes.

#### **ADVERTENCIAS:**

Hable con su médico si presenta dolor constante y significativo en la parte superior del abdomen o la espalda con dificultad para respirar en cualquier momento después de recibir OverStitch. OverStitch contiene níquel. El níquel puede causar una reacción alérgica en personas con sensibilidad a este elemento químico.

#### **POSIBLES RIESGOS:**

Aspirar hacia los pulmones cualquier objeto o sustancia extraños, como alimentos, saliva o contenido estomacal; obstrucción intestinal; cambiar a un tipo diferente de cirugía; náuseas, vómitos, deshidratación; hemorragia; infección; hinchazón, enrojecimiento y dolor en los tejidos causados por lesiones o daños; daño u orificio a través del tejido alrededor del estómago, el esófago o los órganos circundantes; transferencia accidental de líquido o gas de una zona del cuerpo a otra; dolor; sensación de agujas y alfileres; acumulación de líquido alrededor del estómago; fuga de aire de los pulmones; dificultad para respirar; estrechamiento o contracción en el estómago; apertura de la herida; muerte.

#### **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE RM:**

En determinadas condiciones, se puede realizar una RM si tiene colocado OverStitch. La realización de una exploración en otras condiciones puede provocar lesiones o fallos en el funcionamiento del dispositivo. Informe a su médico o técnico de RM de la presencia del dispositivo antes de someterse a una exploración por RM. Esto les permite tomar las precauciones necesarias.

El anuncio está patrocinado por Boston Scientific.

1. Abu Dayyeh BK, Bazerbachi F, Vargas EJ, et al. Endoscopic sleeve gastroplasty for treatment of class 1 and 2 obesity (MERIT): a prospective, multicentre, randomised trial (Gastroplastia endoscópica en manga para el tratamiento de la obesidad de clase 1 y 2 (MERIT): ensayo prospectivo, multicéntrico y aleatorizado). *Lancet*. 2022;400:441-451.

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos solo permiten la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se pueden encontrar en [www.IFU-BSCI.com](http://www.IFU-BSCI.com).

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las imágenes pertenecen a Boston Scientific.

© 2025 Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados. ENDO-2231606-AA JUN 2025